

신체장식 및 미용술

혈액 및 체액 노출에 대한 대처법

보건상 어떤 위험이 있나?

서비스 제공자와 고객이 HIV(인체 면역결핍 바이러스), B형 간염, C형 간염, 또는 세균, 진균 등의 미생물에 노출될 위험이 있습니다.

장비 또는 표면에 피나 체액이 묻지 않았다고 해서 감염 위험이 없는 것이 아닙니다.

혈액전염병에 관한 사실:

- B형 간염, C형 간염 또는 에이즈에 감염된 사람은 당장은 증상이 나타나지 않을 수 있지만 이러한 질병을 전염시킬 수 있습니다.
- B형 간염 바이러스는 금속, 면, 유리 등의 표면에서 2주 이상 생존할 수 있습니다.
- B형 간염을 예방해주는 백신은 있지만, C형 간염이나 에이즈를 예방해주는 백신은 없습니다.

혈액 또는 체액 노출이란?

- 사용된 바늘에 찔릴 경우
- 사용된 날카로운 물품에 베일 경우
- 손상된 피부(개방 상처, 생채기, 발진 등)에 혈액 또는 체액이 묻을 경우
- 눈, 코 또는 입에 혈액 또는 체액이 묻을 경우
- 오염된 기구 또는 표면을 손상된 피부(개방 상처, 생채기, 발진 등)로 만지거나 취급할 경우

혈액 또는 체액에 노출되었을 경우의 대처법:

- 여러분 자신을 보호하기 위해, 상처를 만지거나 처치할 때에는 반드시 일회용 장갑을 착용하십시오. 혈액 또는 체액이 묻은 물품을 취급할 때에도 장갑을 착용해야 합니다.
- 혈액 또는 체액에 노출된 피부는 비누와 물로 씻으십시오. 출혈이 있을 경우에는 피가 계속 흐르게 놔두십시오.
- 눈, 코 또는 입이 혈액 또는 체액에 노출되었을 경우, 물로 씻으십시오.
- 70% 이소프로필 알코올 등의 피부 소독제를 바른 다음, 깨끗한 붕대(되도록 소독된 것)로 싸십시오.
- 혈액 또는 체액에 노출되었을 경우, 즉시 진료를 받으십시오.
- 혈액 또는 체액이 묻은 모든 표면을 세척한 후, 표백제 ¼컵, 물 2¼컵의 비율로 배합한 표백액 등의 중간 수준 또는 높은 수준 소독제를 묻혀 10분간 소독하십시오. 자세한 것은 가정용 표백제를 사용한 소독액(5.25%) 도표를 참고하십시오.
- 혈액 또는 체액을 닦아내는 데 사용한 형질은 비닐 백에 밀봉하여 쓰레기통에 폐기하십시오.
- 혈액 또는 체액에 노출된 고객이나 동료에 대한 처치가 끝난 후, 또는 혈액 또는 체액이 묻은 물품을 처리한 후, 장갑을 벗고 손을 씻으십시오. 손씻기 포스터를 참고하십시오.
- 우발적인 혈액 및 체액 노출을 낱알이 기록하고, 이 기록을 현장에는 1년 이상, 문서철에는 5년 이상 보관하십시오. 이 기록에는 다음과 같은 내용이 기재되어야 합니다:
 - 혈액 또는 체액에 노출된 사람의 성명(이름 및 성), 우편주소 및 전화번호

신체장식 및 미용술

- 대인서비스 제공자 성명
- 사고 발생일
- 사고 발생 장소
- 사고 발생 경위
- 조치

예방접종을 맞으십시오. B형 간염 예방접종을 적극 권장합니다.

자료 출처: The Ministry of Health and long Term Care, Infection Prevention and control Best Practices for Personal Services Settings, January, 2009.
2010 년 10 월

더 자세히 알아보려면 필 지역(Region of Peel) 공공보건부(Public Health)에
문의하거나(905-799-7700), 웹사이트 www.peelregion.ca/health/bodyandbeautyart 를
방문하십시오.

 **Region of Peel**
Working for you
Public Health