
常規的學校接種疫苗

皮爾區公共衛生部門正在學校和社區診所為7年級及以上的合格學生提供常規的學校免疫接種。所提供的疫苗包括**Meningococcal-C-ACYW**, **Hepatitis B (Hep B)**, 和 **Human Papillomavirus (HPV)**。

這些疫苗對學生都是免費的。有些疫苗在有限的時間內得到公共資助，而且學生可能只有在一定年齡之前才有資格。如果學生沒有安大略省的健康卡，他們仍可接種疫苗。已簽署的同意書在整個疫苗接種系列中均有效。同意可隨時撤回。



腦膜炎球菌病是一種通常由五種不同的細菌引起的感染，它們感染大腦和脊髓周圍的血液或液體。這是一種罕見的疾病，但症狀很快就可能危及生命。這種疾病的併發症可導致腦損傷、永久性聽力喪失、癲癇發作、截肢或死亡。

它通過直接接觸受感染者的唾液或粘液來**傳播**，也可以通過接吻、分享飲料、用具或牙刷等方式來傳播。

Men-C-ACYW 疫苗 (Nimenrix®, Menactra®, Menveo™) 對引起感染的四組細菌有防護作用。該疫苗是安全的，有效性為80-85%。

在安省上學需接種單劑量疫苗，除非學生有有效的豁免。建議所有青少年接種Men-C-ACYW疫苗，即使他們以前在嬰幼兒時期就接種過疫苗。



乙型肝炎是一種侵襲肝臟並可導致肝病和肝癌的傳染性非常強的病毒。無治癒的方法。大多數人的病情會好轉，但其他人會繼續被感染，並攜帶病毒進入體內度過餘生。

它通過直接接觸受感染者的血液或體液**傳播**，即使他們沒有看起來或感覺不舒服。它可以通過共用剃鬚刀、針頭或牙刷、無保護措施的性行為以及清潔不當的紋身或水療設備進行傳播。

乙型肝炎疫苗 (Recombivax HB® or Engerix®-B) 是安全的，在接種所有劑量時，其有效性超過95%。

11-15歲的學生需要注射2劑疫苗，間隔4-6個月。免疫系統較弱或16歲及以上的學生需要第三次注射。

Human Papillomavirus是一種非常常見的病毒，可導致口腔、頭頸部、子宮頸癌和生殖器癌。許多人不知道自己被感染了，也從來沒有出現過症狀，所以他們可以在不知道的情況下將其傳染給其他人。沒有治癒方法，而且如果沒有免疫接種的話，據估計，4個性行為活躍的加拿大人中有3個將在其一生中感染HPV。

它通過在生殖器區域或性行為期間的皮膚接觸**傳播**。預防HPV病毒感染的最好方法是在第一次性行為前接種疫苗。

HPV-9 疫苗 (Gardasil®-9) 是安全的，在接種所有劑量時，其有效性超過95%。它可以預防感染可能導致癌症的七種病毒和兩種可能導致生殖器疣的病毒。

15歲以下的學生需要接種2劑，間隔6個月。免疫系統薄弱或15歲及以上的學生將需要注射第三針。

在接種了疫苗後，我能期待什麼？

學生將被詢問以下病史問題：

- 學生是否有任何嚴重的健康狀況？
- 學生是否有會削弱免疫系統的疾病，和／或正在服用免疫抑制藥物？• 學生是否有任何已知的過敏？
- 學生過去是否曾對疫苗產生嚴重反應？（如：過敏性休克、皮疹）
- 學生在接種疫苗時是否曾經昏厥？

大多數人在接種了疫苗後都沒有任何問題。有些可能有手臂疼痛或打針部位紅腫、腫脹或發癢。

偶爾也會出現疲勞、頭痛、頭暈、昏厥、噁心和輕微發燒。





何時應該打電話給您的醫生：

- 接種疫苗後的過敏和嚴重反應非常罕見。副作用可能會在免疫接種後大約一周內發生，可能包括：呼吸困難，面部或口腔的腫脹，蕁麻疹，臉色蒼白或嗜睡，癲癇，發燒40°C以上 。
- 如果您有以下任何症狀，請撥打911。
- 將可能與疫苗相關的不良反應通報給您的醫生以及皮爾區公共衛生部，電話：905-799-7700；卡利登地區：905-584-2216。

若要獲得更多資訊，請訪問 **peelregion.ca/immunize**
或致電皮爾區公共衛生部門 **905-799-7700.**

CDS-1369 25/11 Trad. Chinese