

كوفيد-19 الفحص المدرسي

هل تعاني من عرض أو أكثر من الأعراض الجديدة أو المتفاقمة التالية؟

آلام في العضلات و / أو آلام المفاصل
(للبالغين)



درجة حرارة ≤ 37.8 م° أو قشعريرة



سعال



فقدان حاسة الشم أو التذوق



غثيان، قيئ أو إسهال (للأطفال)



ضيق في التنفس



إذا كنت قد تلقيت لقاح كوفيد-19 خلال الـ 48 ساعة الماضية وشعرت فقط بعد التطعيم بصداع خفيف و / أو إرهاق و / أو آلام في العضلات و / أو آلام في المفاصل، ولا توجد أعراض أخرى، أجب بـ "لا" على هذه الأسئلة

تعب شديد (للبالغين)



هل تم إخطارك من قبل مقدم الرعاية الصحية أو "الإدارة الصحية العامة" أو من خلال تطبيق "Alert app" الخاص بكوفيد-19 بأنه يجب عليك في الوقت الحالي العزل الذاتي أو البقاء في المنزل؟



في الأيام العشرة الأخيرة، هل تم التشخيص بأنك "شخص مخالط" لشخص مصاب بكوفيد-19؟ إذا كنت قد تلقيت التطعيم بالكامل* أو كانت نتيجة التحليل السابق إيجابية**، ولا تعاني من أي أعراض، ولم يتم إخبارك بالعزل الذاتي، أجب بـ "لا".



خلال آخر 14 يومًا، هل سافرت خارج كندا وتم التنبيه عليك بالحجر الصحي أو بعدم الذهاب إلى المدرسة؟



هل يعاني أي شخص تعيش معه حاليًا بأي أعراض جديدة لكوفيد-19 و / أو ينتظر نتائج الاختبار؟ إذا كنت قد حصلت على التطعيم بالكامل* أو كانت نتيجة التحليل السابق إيجابية** ولا تعاني من أي أعراض، ولم يتم التنبيه عليك بتنفيذ العزل الذاتي أو إذا كانت أعراض الشخص المخالط مرتبطة بتلقي لقاح كوفيد-19 خلال آخر 48 ساعة، فأجب بـ "لا".



في خلال الأيام العشرة الماضية، هل كانت نتيجة اختبار المستضد السريع أو نتيجة الاختبار الذاتي باستخدام مجموعة الاختبار المنزلية إيجابية؟ إذا كانت نتيجة الفحص الذي أجرته في اختبار PCR في المعمل منذ ذلك الحين سلبية، أجب بـ "لا".

إذا أجبت بـ "نعم" على أي من الأسئلة أعلاه أو كنت تشعر بإعياء أو لست على ما يرام، يرجى البقاء في المنزل. إذا كنت تعاني من أعراض أو كنت مخالطًا لشخص مصاب، قم بإجراء الاختبار و / أو التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

*التطعيم الكامل: يُقصد بالتطعيم الكامل أنك تلقيت جميع الجرعات المطلوبة من لقاح كوفيد-19 المعتمد قبل 14 يومًا على الأقل. قم بزيارة موقعنا على الإنترنت لمزيد من المعلومات التفصيلية.

**نتيجة تحليل سابق سلبية: يُقصد بذلك إصابتك بكوفيد-19 خلال الـ 90 يومًا الماضية، وتعافيت، وأكملت فترة العزل ابتداءً من توقيت العدوى الأولية. إذا كنت تعاني من نقص المناعة، فيجب عليك الاستمرار في اتباع جميع توجيهات هيئة الصحة العامة السارية، حتى لو كنت قد تلقيت التطعيم بالكامل أو كانت نتيجة اختبار سابق لكوفيد-19 سلبية. إذا كانت لديك أي أسئلة، بادر بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.