


LA TUBERCULOSE : CONNAISSEZ LA DIFFÉRENCE


INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE (ITL)

TUBERCULOSE ACTIVE



LE GERME DE LA TUBERCULOSE EST DORMANT

Vous avez les germes dans votre corps, mais celui-ci les a empêchés de se multiplier; par conséquent, ils ne peuvent pas causer de dommage.




LE GERME DE LA TUBERCULOSE CAUSE DES DOMMAGES

Les germes de la tuberculose se multiplient et causent des dommages. La tuberculose s'attaque habituellement aux poumons, mais elle peut toucher d'autres organes.

RÉSULTAT POSITIF AU TEST CUTANÉ



Vous avez obtenu un résultat positif au test cutané, mais votre radiographie pulmonaire ne révèle pas de tuberculose active. Vous pourriez finir par avoir la tuberculose active à un moment donné.



SYMPTÔMES

Vous êtes malade. Les symptômes suivants peuvent se manifester :

- faiblesse, fièvre et perte de poids;
- toux et douleur thoracique;
- toux qui produit des crachats sanglants (si la tuberculose est dans les poumons);
- douleur (si la tuberculose touche d'autres parties du corps).



NON

CONTAGIEUX?

Vous n'êtes pas contagieux et vous n'êtes pas malade.



OUI

Vous êtes contagieux si le germe de la tuberculose est dans vos poumons.


TRAITABLE



PRÉVENIR LA TUBERCULOSE ACTIVE

On peut traiter l'infection tuberculeuse latente par l'administration de médicaments pendant 6 à 12 mois. Le traitement servira à prévenir la tuberculose.

TRAITABLE



GUÉRIR ET PRÉVENIR LA TRANSMISSION

La tuberculose active est traitable et curable pourvu qu'on prenne tous ses médicaments. Le traitement précoce prévient la transmission de la tuberculose aux autres.

Les dessins de têtes d'œufs sont utilisés avec la permission d'Alberta Health.