

गर्भावस्था, गर्भ-निरोध तथा स्तनपान

टीबी की दवायें लेने के दौरान गर्भावस्था को टालिये। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं या फिर गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर को बतायें।

टीबी की कुछ दवायें गर्भनिरोधक गोलीयों को ठीक से काम नहीं करने देती। गर्भावस्था को टालने के लिये आप को संतति-निग्रह के और तरीके अपनाने चाहिये। ज़्यादा जानकारी या संतति-निग्रह के साधन के लिये अपने डॉक्टर या नर्स से बात करें या स्वस्थ यौनसंबंधित दवाखाना (Healthy Sexuality Clinic) में जायें। अगर आप को गर्भनिरोध के बारे में जानकारी या Healthy Sexuality Clinic के पते की ज़रूरत हो तो ९०५-७९९-७७०० (905-799-7700) पर फोन करें।

सक्रिय टीबी रोगग्रस्त महिलायें जो गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं, उन पर टीबी की चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर की देखभाल होनी चाहिये। डॉक्टर सलाह देगा कि टीबी की कौन सी एन्टीबायोटिक का उपयोग गर्भावस्था में तथा स्तनपान कराते समय सुरक्षित है।

अगर माता को अपनी गर्भावस्था के दौरान या जनम देने के तुरंत बाद में सक्रिय टीबी हुआ हो तो नवजात शिशु का टीबी का परीक्षण करवाना चाहिये। टीबी की दवा ले रही माता के दूध में पाया जाने वाला टीबी की दवा का छोटा सा अंश, उस का दूध पीने वाले शिशु को ना तो टीबी होने से बचा सकता है, ना ही उस का उपचार कर सकता है।